



HemaGel® – jak snadno a rychle ošetřit ránu

HemaGel® nabízí unikátní řešení hojení ran jak akutních, jako jsou řezné rány, odřeniny, popáleniny I. a II. stupně, opary (např. drobných poranění v domácnosti, při sportu či hrách), tak chronických ran typu bércových vředů způsobených poškozením žilního nebo tepenného systému, diabetické nohy, proleženin, pooperačních a ostatních poškození kůže. K výjimečným vlastnostem HemaGel® přispívá vlhké prostředí při léčbě ran. Stabilní vlhkost v ráně zabraňuje tvorbě strupů a tím pomáhá urychlovat proces hojení.

Proč používat formu gelu k ošetřování ran?

HemaGel® díky svým vlastnostem prokázal v klinických zkouškách, že:

- chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají při zánětlivých procesech
- vytváří optimální pH v ráně a tím napomáhá hojení
- prověřená struktura gelu zabraňuje uvolňování částic gelu do rány s následnou iritací (nepřisychá)
- dodává vlhkost do rány
- zabraňuje vysušování rány a tvorbě strupů
- má savou schopnost a tím čistí znečištěné rány
- snižuje bolestivost ran
- podporuje uzavírání rány jizvou
- při včasné aplikaci zabraňuje vzniku jizvy, případně zlepšuje její vzhled

Složení:

HemaGel® je hydrofilní methakrylátový gel na bázi síťovaného kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminoskupiny, vyvinutý Ústavem Makromolekulární Chemie AV ČR.

Jak postupovat při použití gelu:

- Očistěte ránu od mechanických nečistot, např. částic prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně dráždit a poškozovat ránu.
- Otevřete tubu vpichem pomocí otočeného víčka.
- Aplikujte malé množství gelu na celou spodinu rány. Gel přilne na spodinu rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
- Ránu primárně kryjte sterilním čtvercem nejlépe z nesavého textilu (např. mastný tyl) a sekundárně fixujte obinadlem nebo náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářkovou náplastí. Fixační materiály musí přesahovat cca 1 cm přes okraj rány.
- U indikovaných pacientů s prokázanou infekcí je nutné dodržet ordinaci ATB a dalších léků dle rozhodnutí lékaře.
- Pacienti s indikací kompresivní terapie mají léčbu doplněnou o bandáž krátkotažným obinadlem.
- Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné odstranění bez bolesti jemným setřením.
- Převoz provádějte dle potřeby nejdéle po 24 hodinách. U infikovaných ran doporučujeme častější výměny.

Poznámky:

Dosavadní praxe a klinické zkoušky ukázaly, že vlhké prostředí výrazně urychluje proces hojení, podporuje dělení a pohyb buněk v ráně. Zároveň udržuje stálou teplotu v ráně, což je velmi důležité pro kvalitní zhojení. Při léčbě komplikovaných a infikovaných ran je nezbytné dodržovat další požadavky na léčbu, např. dostatečnou výživu, čistotu rány, léčbu vedlejších onemocnění a dodržování dalších léčebných pokynů lékaře.

Kontraindikace:

Při použití HemaGel® nebyly popsány žádné vedlejší účinky typu alergií, zvýšení bolestivosti apod., ani žádné další kontraindikace. Lehké kožní podráždění u osob se zvýšenou citlivostí, např. lehké svědění, není na závadu.

Upozornění:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí apod.) přerušete léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Chraňte před dětmi! Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na tubě.

Skladování:

Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C

Balení:

Tuba 5g, 30g

Výrobce:

WAKE spol. s r.o., Šrobárova 1869/14, 100 41 Praha 10, Česká republika, www.wake.cz